

Psychologiczne leczenie depresji u młodych dorosłych i dorosłych z wadami serca

P POPULACJA

3 KRAJE

3 BADANIA

480 OSÓB z wrodzonymi wadami serca

I INTERWENCJA

- poradnictwo
- terapia rozmową
- psychoterapia
- terapia poznawczo-behawioralna

C CO PORÓWNUJEMY

zwykła opieka



O O CO PYTAMY



1 Wskaźnik depresji wg ankiety HADS (obserwacja: 3 miesiące)

NIEPOŻĄDANY PUNKT KOŃCOWY

interwencje psychologiczne vs zwykła opieka

brak różnic

GRADE low



2 Wskaźnik depresji wg ankiety HADS (obserwacja: 12 miesięcy)

NIEPOŻĄDANY PUNKT KOŃCOWY

interwencje psychologiczne vs zwykła opieka

brak różnic

GRADE low

WNIOSKI

Interwencje psychologiczne (rozmowa terapeutyczna/poradnictwo) mogą zmniejszać nasilenie objawów depresji u dorosłych z wrodzonymi wadami serca. Konieczne są dalsze badania w celu określenia najlepszej formy terapii psychologicznej w tej populacji z uwzględnieniem czasu trwania, częstotliwości i rodzaju interwencji.